

ترجمان دانش

هانیه داودی

عنوان: بررسی فراوانی انواع سندروم های نفروتیک پس از واکسیناسیون کووید-۱۹ در سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ در شهر زنجان

کد سمات: A-12-1150-5

همکاران طرح: نادیا آقارفعی، بهاره حاجی سلیمی

دانشکده: پزشکی

تاریخ خاتمه یافته طرح: ۱۴۰۳/۱/۱۸

تعیین گروه مخاطب :

۱. متخصصین سلامت

۲. سیاست گذاران درمانی

خبر پژوهش :

بیشترین سندروم نفروتیک بروز یافته از نوع MGN و پس از دریافت واکسن سینوفارم در میانگین بازه زمانی ۲۶ روز اول بوده است.

پیام پژوهش:

مطالعه ی مقطعی حاضر به بررسی میزان بروز انواع سندروم نفروتیک پس از واکسیناسیون کووید-۱۹ پرداخته است . این مطالعه به صورت سرشماری بوده و در آن تمامی موارد جدید سندرم نفروتیک به دنبال دریافت واکسن کووید-۱۹، با استناد به پرونده های بیماران در بیمارستان ولیعصر(عج) شهر زنجان مورد بررسی قرار گرفت . بازه ی زمانی مورد نظر برای بررسی بروز انواع سندرم های نفروتیک ، از زمان دریافت آخرین دوز واکسن کوید -۱۹ تا حداکثر سه ماه پس از آن بود. در نهایت از میان ۱۶۹ پرونده مورد بررسی (۷۸ پرونده مرتبط با عوارض واکسن کووید-۱۹ و ۹۱ پرونده مربوط به بروز جدید سندروم نفروتیک، ۱۱ نمونه وارد مطالعه شد. به علت تعداد محدود داده های مورد بررسی در مطالعه، استفاده از آزمون های آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها مقدور نبوده و بررسی داده ها به صورت توصیفی انجام گردید . نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که بیشترین سندروم نفروتیک بروز یافته پس از واکسیناسیون از نوع MGN بوده و تمامی موارد MGN پس از دریافت واکسن سینوفارم و بیشتر به دنبال تزریق دوز اول واکسن با میانگین فاصله زمانی ۲۶ روز رخ داده است. در این مطالعه جنس تاثیری بر نوع سندروم نفروتیک بروز یافته نداشته است. بیشترین میزان بروز سندروم نفروتیک در رنج سنی میانسال رخ داده است.