

ترجمان دانش

نام مجری: الهام غلامیان

عنوان: بررسی عوامل پیش بینی کننده و پیامدهای بالینی ترومبولیتیک تراپی و آنژیوپلاستی اولیه در بیماران سکته ی قلبی مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله موسوی زنجان ۱۴۰۰-۱۴۰۱

کدسمات: A-11-148-33

همکاران: نسرین حنیفی، پروین شیری قیداری

دانشکده: پرستاری مامایی

تاریخ خاتمه: ۱۴۰۵/۷/۱۵

تعیین گروه مخاطب :

- ۱. رسانه ها و عموم مردم ☒
- ۲. متخصصین سلامت ☐
- ۳. سیاست گذاران پژوهشی ☐
- ۴. سیاست گذاران درمانی ☒

خبر پژوهش :

به نظر می رسد آنژیوپلاستی اولیه و ترومبولیتیک تراپی از نظر عوارض و پیامدهای بالینی در درمان بیماران مبتلا به سکته قلبی تفاوت چندانی ندارند.

پیام پژوهش:

آنژیوپلاستی اولیه و ترومبولیتیک تراپی دو روش مورد استفاده در درمان STEMI جهت برقراری مجدد جریان خون در رگ مسدود هستند. در این طرح به بررسی عوامل پیش بینی کننده انتخاب روش درمان و مقایسه عوارض و پیامدهای بالینی آن ها در بیماران مبتلا به سکته قلبی پرداختیم. در این مطالعه دریافتیم علیرغم نتایج کارآزمایی های بالینی متعدد، بیماران تحت درمان با آنژیوپلاستی اولیه و ترومبولیتیک تراپی از نظر عوارض و پیامدهای بالینی تفاوتی نداشتند. بنابراین می توان از ترومبولیتیک تراپی همچنان به عنوان یک گزینه مناسب جایگزین برای آنژیوپلاستی اولیه در مواقعی که دستیابی به آن در زمان طلایی ممکن نیست، استفاده کرد. همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد بیشتر بیمارانی که با تاخیر به مراکز درمانی مراجعه داشته اند به علت از دست دادن زمان طلایی برای خون رسانی مجدد عروق کرونر مسدود، تحت درمان دارویی به عنوان مداخله اولیه درمانی قرار گرفته اند و دچار عوارض بیشتر و پیامدهای بالینی نامناسب شده اند. بنابراین باید سیاستی اتخاذ شود تا پرستاران مجرب و تحصیل کرده با ارائه دوره های آموزشی به گروه های جمعیتی خاص در مورد علائم بیماری سکته قلبی و ضرورت درمان هر چه سریع تر آن، اطلاعات لازم را در اختیار افراد جامعه قرار دهند.