

فرم ترجمان دانش

نام مجری: زهرا بیگدلو

عنوان: ساخت، مشخصه یابی و بررسی اثرات ضد سرطانی نانوحامل های هیبریدی نیوزوم- بیسموت هدفمند شده با گلو تاتیون حاوی مهار کننده PI3K و دوکسوروبیسین بر رده سلولی گلیوبلاستوما ی انسانی (U87)

همکاران طرح: بهروز جوهری ، محمود غرباوی، قاسم باقرپور، حامد رضائی جم

کدسمات: A-12-1244-28

دانشکده: پزشکی

تاریخ خاتمه یافته: 1405/4/13

تعیین گروه مخاطب:

- ☐ 1. رسانه ها و عموم مردم
- ☐ 2. متخصصین سلامت
- ☒ 3. سیاست گذاران پژوهشی
- ☒ 4. سیاست گذاران درمانی

خبر پژوهش :

نانوحامل هوشمند بیسموت-نیوزوم هدفمند حاوی دوکسوروبیسین و مهار کننده PI3K ، قادر به مهار رشد و مهاجرت سلول های گلیوبلاستوما از طریق شیمی درمانی-پرتودرمانی سینرژیک می باشد

پیام پژوهش:

گلیوبلاستوما یکی از کشنده ترین تومورهای مغزی است و درمان آن به دلیل مقاومت بالای سلول های سرطانی به روش های رایج مانند شیمی درمانی و پرتودرمانی با چالش های جدی روبه روست. این مقاومت اغلب از مسیرهای پیام رسان معیوب درون سلولی مانند PI3K نشأت می گیرد و استفاده از یک دارو به تنهایی معمولاً کافی نیست. در این پژوهش، محققان یک نانوذره ترکیبی هوشمند طراحی کرده اند که از سه راهبرد هم زمان برای مقابله با این سرطان بهره می برد: دارورسانی هدفمند، مهار مسیر پیام رسان معیوب و ترکیب شیمی درمانی با پرتودرمانی. بخش اصلی این سامانه از دو جزء تشکیل شده است: نانوذرات بیسموت که حساسیت سلول ها به اشعه ایکس را افزایش می دهند و نیوزوم ها که حباب های چربی مانندی برای حمل دارو هستند. این نانوحامل دو داروی مهم را یک جا حمل می کند؛ دوکسوروبیسین که یک داروی شیمی درمانی رایج است و یک مهار کننده PI3K که مسیر پیام رسان خطا را متوقف می سازد. برای آنکه داروها دقیقاً به سلول های سرطانی برسند و به بافت های سالم آسیب نزنند، سطح نانوذره با مولکول های هدف گیری کننده ای مثل گلو تاتیون پوشانده شده که سلول های گلیوبلاستوما گیرنده های آن را به وفور دارند. نتایج آزمایشگاهی روی رده سلولی U87 نشان داد که این نانوسامانه پس از ساخت موفق، از پایداری و سازگاری خونی خوبی برخوردار است و به خوبی جذب سلول های سرطانی می شود. هنگامی که این سلول ها تحت درمان با نانودارو و تابش اشعه ایکس قرار گرفتند، چند اتفاق مهم افتاد: رشد و تکثیر سلولی به طور چشمگیری کاهش یافت، ژن های مرتبط با بقا و تهاجم سلولی خاموش شدند، چرخه تقسیم سلولی مختل گردید، درصد قابل توجهی از سلول ها دچار مرگ برنامه ریزی شده (آپوپتوز) شدند و توانایی مهاجرت آن ها افت شدیدی پیدا کرد. نکته امیدوار کننده آن بود که اثر ترکیب دارو و پرتودرمانی به صورت هم افزا بیشتر از مجموع اثر هر کدام به تنهایی بود. این پژوهش گامی رو به جلو در توسعه درمان های چندگانه برای گلیوبلاستوما محسوب می شود و نشان می دهد که مهار هم زمان مسیرهای پیام رسان، دارورسانی هدفمند و تشدید اثر پرتو می تواند بر محدودیت های درمان های فعلی غلبه کند. هرچند این یافته ها در فضای آزمایشگاهی به دست آمده و برای ورود به کلینیک به مطالعات حیوانی و انسانی بیشتری نیاز دارد، اما چشم انداز تازه ای برای بهبود اثربخشی و کاهش عوارض جانبی در اختیار پزشکان و محققان قرار می دهد.

داور

استاد راهنما / مشاور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران / تهران
دکتر محسن روزجری
Behroz
روزجری